


Assistance à l'accouchement


Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des 2 dernières années précédant l'enquête, dont l'accouchement s'est fait avec l'assistance d'un personnel de santé qualifié



L'assistance pendant l'accouchement par un personnel de santé qualifié (médecin, infirmier (e)/sage-femme/aide-soignant) reste faible dans les régions de l'Extrême-Nord et du Nord.

Lieu de l'accouchement


Répartition en % de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des 2 dernières années précédant l'enquête, selon le lieu d'accouchement de leur dernière naissance



La proportion de naissances survenues en milieu hospitalier reste faible en milieu rural que ce soit dans le secteur public (34 %) ou dans le privé (11 %).

Séjour post-partum dans une formation sanitaire

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans une formation sanitaire au cours des 2 dernières années précédant l'enquête et dont la durée de séjour post-partum est de 12 heures ou plus dans la formation sanitaire



Le pourcentage de femmes qui ont séjourné 12 heures ou plus dans une formation sanitaire après l'accouchement varie de 27 pour cent au Nord à 99 pour cent au Sud-Ouest.

Pour tout renseignement concernant la MICS 5 2014, contacter :
L'Institut National de la Statistique (INS)
BP 134, Yaoundé, Cameroun
Téléphone : (237) 222 220 445
Fax : (237) 222 232 437

Internet : www.statistics-cameroon.org


Photo de couverture Comité National de Lutte contre le Sida



CAMEROUN




Santé de la reproduction



Décembre 2015

Taux de fécondité des adolescentes


Nombre de naissances vivantes pour 1000 femmes de 15-19 ans pour la période des trois années ayant précédé l'enquête



La fécondité des adolescentes (15-19 ans) demeure élevée au Cameroun.

Utilisation de la contraception


Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement mariées ou en union qui utilisent (ou dont le conjoint utilise) une méthode de contraception



La contraception moderne reste peu utilisée.

Nombre de consultations prénatales et moment de la première visite


Pourcentage de femmes qui ont fait quatre visites ou plus et répartition en % de femmes selon le nombre de mois de grossesse au moment de la première visite prénatale



Dans l'ensemble, parmi les femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années, près de trois sur cinq (59 %) ont effectué au moins 4 visites prénatales, mais seulement près d'une femme sur trois a effectué la visite prénatale avant quatre mois, comme recommandé.

Indice Synthétique de Fécondité


Nombre de naissances vivantes qu'une femme aurait si elle était soumise aux taux actuels de fécondité selon le niveau d'instruction



Des écarts importants de niveaux de fécondité selon le niveau d'instruction des femmes.

Besoins non satisfaits en matière de contraception


Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement mariées ou en union avec un homme et ayant un besoin non satisfait en matière de planification familiale



Ces femmes sont fécondes, elles n'utilisent pas la contraception mais elles souhaitent espacer leur prochaine naissance ou ne désirent plus d'enfants. Elles sont plus nombreuses à Yaoundé/Douala qu'en milieu rural et dans les autres villes.

Assistance à l'accouchement

Répartition en % des femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des 2 dernières années ayant précédé l'enquête, selon la personne qui a assisté l'accouchement



Près de trois naissances sur dix ont eu lieu sans l'assistance d'un personnel qualifié.