



Conseil et test du VIH durant les consultations prénatales

■ Pourcentage de femmes qui/à qui:



Multiplicité des partenaires sexuels et utilisation du condom

Pourcentage de personnes de 15-49 ans qui ont eu plus d'un partenaire sexuel dans les 12 derniers mois et rapportent avoir utilisé un condom lors du dernier rapport sexuel




Le pourcentage de personnes qui ont eu plus d'un partenaire sexuel durant les 12 derniers mois et rapportent avoir utilisé un condom lors du dernier rapport sexuel reste faible.

Les bonnes pratiques en matière de prévention du VIH restent encore peu courantes chez les femmes lors des consultations prénatales.

Pour tout renseignement concernant la MICS 5 de 2014, contacter :
 L'Institut National de la Statistique (INS)
 BP 134, Yaoundé, Cameroun
 Téléphone : (237) 222 220 445
 Fax : (237) 222 232 437
 Internet : www.statistics-cameroon.org
 Photo de couverture Comité National de Lutte contre le Sida



CAMEROUN



MICS

2014


VIH/SIDA ET COMPORTEMENTS SEXUELS AU CAMEROUN



Décembre 2015

Connaissance de la prévention de la transmission du VIH


Pourcentage de personnes de 15-49 ans qui savent qu'on peut prévenir la transmission du VIH en :



La connaissance des deux principaux moyens de prévention de la transmission du VIH reste faible.

Idées erronées sur le VIH


Pourcentage de personnes de 15-49 ans qui savent que le VIH ne peut être transmis par/en :



On observe une persistance des idées erronées sur la transmission du VIH notamment en ce qui concerne « les piqûres de moustiques ».

Connaissance approfondie du VIH


Pourcentage des personnes de 15-49 ans qui :



Peu de personnes connaissent les deux moyens de prévention du VIH (fidélité à un seul partenaire non infecté et usage du préservatif à chaque rapport sexuel), savent qu'une personne paraissant en bonne santé peut avoir le VIH et rejettent les deux idées erronées les plus répandues ("Le VIH peut être transmis par les piqûres de moustiques" et "Le VIH peut être transmis par les moyens surnaturels"). Ce constat reste valable chez les jeunes femmes de 15-24 ans.


Connaissance approfondie du VIH

Pourcentage de femmes de 15-24 ans qui ont une connaissance approfondie du VIH



Connaissance de la transmission du VIH de la mère à l'enfant


Pourcentage de personnes de 15-49 ans qui savent que le VIH peut être transmis de la mère à l'enfant :



Le pourcentage de personnes de 15-49 ans qui identifient correctement les moments de transmission du VIH de la mère à l'enfant est peu élevé.

Pratique d'un test et connaissance d'un lieu de dépistage du VIH

Pourcentage de personnes de 15-49 ans qui :



Plus de huit personnes sur dix savent où aller pour le test de VIH.